

onderdeel C

bijlage

opdrachten 1 en 2

opdracht 1

informatie geitenziektes

<p>Zomerlongontsteking</p> <p>Zomerlongontsteking is longontsteking bij schapen en geiten die veroorzaakt wordt door de bacterie <i>Pasteurella haemolytica</i>. De naam is wat misleidend omdat het niet alleen in de zomer te zien is, maar vanaf het voorjaar tot ver in de herfst. Zomerlongontsteking komt vooral voor bij opgroeiende lammeren. Meestal worden er meerdere dieren uit een koppel ziek of gaan dood. Mogelijke oorzaken van een ziekte- uitbraak zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• slechte weersomstandigheden• grote schommelingen in dag- en nachttemperatuur• een slecht klimaat op stal• stress rond het spenen <p>Het is verstandig om de lammeren vanaf een leeftijd van 3 weken voor de eerste keer te vaccineren en 4 weken later voor de tweede keer.</p>	<p>Zere bekjes</p> <p>Zere bekjes of ecthyma komt veel voor bij schapen en geiten en is een aandoening van huid en slijmvlies die veroorzaakt wordt door een virus. De grootste problemen doen zich voor bij lammeren. Zere bekjes is een zoönose; ook de mens kan hiermee besmet worden. Er bestaat een vaccin tegen zere bekjes, maar het vaccin mag alleen worden toegepast in een besmette omgeving of omgeving waarin het risico op zere bekjes zeer hoog is. Het vaccin moet eenmalig 4 weken voor het lammeren worden toegediend.</p>
<p>Het bloed</p> <p>Het bloed treft vooral jonge en snel groeiende lammeren. De meeste sterfte vindt plaats bij dieren van 3-10 weken oud. Ook onder goed gevoerde dieren van een half tot één jaar vallen regelmatig slachtoffers. De ziekte staat ook bekend als bloedziekte, weeldeziekte en eiwitvergiftiging. De aandoening wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none">• voer eten met veel koolhydraten en eiwitten en met weinig structuur• te veel melk drinken• een te snelle overgang naar weide met jong en eiwitrijk gras <p>Een behandeling komt bijna altijd te laat. Vermijd plotselinge voerveranderingen ter preventie. Vaccinatie van de moederdieren en de lammeren is mogelijk. Deze vaccinatie dient 2 keer gegeven te worden met een tussentijd van 4 weken.</p>	<p>Q-koorts</p> <p>Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. Alle professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven, opfokbedrijven met meer dan 50 dieren die bestemd zijn voor de melkproductie en bedrijven waar publiek mag komen, zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten te vaccineren. Dieren ouder dan 3 maanden die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten ook gevaccineerd zijn, uiterlijk 3 weken voor het evenement.</p>

opdracht 2 klauwverzorging



HARINGKAAKMESJE
Kwaliteitsmesje uit Solingen. Extra nageslepen.
Zeer geschikt voor kleine hoefdieren.
Gebruik door ervaren klauwbekappers.

€ 4,09



HOEFMES RECHTSHANDIG
Kwaliteitshoefmes. Rechtssnijdend, normaal geslepen, ebbenhouten heft.
Geschikt voor grote hoefdieren.
Gebruik door ervaren klauwbekappers.

€ 23,93



HOEFSCHAAR FELCO 51
Zeer degelijke hoefschaar, speciaal ontwikkeld voor schapenhoefjes. Roestvrije, zeer zware uitvoering met geplastificeerde handgrepen.

€ 58,14



HOEFSCHAAR FELCO 50
Professioneel model. Speciaal ontwikkeld voor het knippen van schapen- en geitenhoefjes. Roestvaste, zeer zware uitvoering met geplastificeerde handgrepen.

€ 67,48



HOEFSCHAAR MARK
Lichtgewicht schaar.
Perfect geschikt voor het knippen van geitenhoefjes.
De smalle messen vergemakkelijken het gebruik van moeilijk te bereiken plekken.

€ 20,25



HOEFTANG FRANK
Edelmetalen hoef tang voor koeien.

€ 105,-



WETSTEENTJE
Voor het scherp houden van hoefmessen en hoefscharen.

€ 4,75



HOEFREINIGER
Om paardenhoeven mee uit te krabben, met kunststof overtrokken handgreep.

€ 0,99